

INFORME DE CONSENS DE CAPIL.LAROSCÒPIA PERIUNGUEAL.

GRUP CapicAT DE LA SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA

Versió 2016.

Augments del videocapil.laroscop:

PARÀMETRES VALORATS:

- 1. Densitat capil.lar:**
 - Normal
 - Disminuida
 - Molt Disminuida
 - No valorable
- 2. Àrees avasculars / Àrees de pèrdua capil.lar:**
 - Absència
 - Aïllades (presència en ≤ 2 dits)
 - Generalitzades
 - No valorable
- 3. Diàmetre capil.lar:**
 - Normal
 - Dilatats
 - Capil.lars Gegants
 - No valorable
- 4. Ramificacions simples:**
 - Absència
 - Aïllats (≤ 3 ramificacions)
 - Moderats
 - Abundants (≥ 10 ramificacions)
 - No valorable
- 5. Ramificació complexa:**
 - Absència
 - Aïllats (≤ 3 ramificacions)
 - Moderats
 - Abundants (≥ 10 ramificacions)
 - No valorable
- 6. Hemorràgies pericapil.lars:**
 - Absència
 - Aïllats (≤ 3 hemorràgies)
 - Moderats
 - Abundants (≥ 10 hemorràgies)
 - No valorable

7. Trombosi capil.lar:

- Absència
- Aïllats (≤ 3 trombosis)
- Moderats
- Abundants (≥ 10 trombosis)
- No valorable

8. Tortuositats:

- Absència
- Presència
- No valorable

9. Organització del llit periungueal:

- Normal
- Desestructuració aïllada (en ≤ 2 dits)
- Desestructuració generalitzada
- No valorable

10. Plexe venós subpapilar:

- Visible
- No visible
- No valorable

CONCLUSIONS:

- Capil.laroscòpia no valorable
- Capil.laroscòpia normal
- Capil.laroscòpia alterada:
 - Patró tipus esclerodermia inicial
 - Patró tipus esclerodermia actiu
 - Patró tipus esclerodermia tardà
 - Anomalies inespecífiques

COMENTARIS:

A VALORAR EN EL CONTEXT CLÍNIC-ANALÍTIC. CAL RECALCAR QUE LA PRESÈNCIA DE PATRONS TIPUS ESCLERODERMIA NO SON PATOGNOMÒNICS D' ESCLEROSI SISTÈMICA